



## **COPROLOGIE FUNCTIONNELLE (FECALOGRAMME)**

### **INTERET**

Cette analyse a pour but d'objectiver les troubles de la digestion et de rechercher les causes des perturbations : troubles moteurs, insuffisances digestives, réaction de la muqueuse.

### **PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT**

Attendre au moins une semaine après des examens (endoscopiques, échographiques ou radiologiques) ayant nécessité une préparation préalable du tube digestif.

- Recueillir la TOTALITE des selles pendant 1 à 3 jours consécutifs
- Utiliser chaque jour un nouveau récipient (fourni par le laboratoire)
- Uriner en dehors du récipient avant d'émettre la selle
- Emettre la selle directement dans le récipient, sans lavement ni suppositoire
- Stocker les récipients hermétiquement fermés dans le bas du réfrigérateur et apporter les 3 récipients au laboratoire à la fin du recueil.

### **REGIME PENDANT LES 3 JOURS PRECEDANT LE RECUEIL ET LES 3 JOURS DU RECUEIL :**

- Suivre le régime habituel en y incorporant midi et soir :
  - des pommes de terre
  - quelques haricots blancs
  - de la viande crue hachée ou à peine saisie
  - du beurre cru
- Eviter : les oléagineux (noix, pistaches, amandes, cacahuètes, olives, avocats ...)
  - les médicaments à base de charbon, de kaolin, paraffine, mucilage, baryte et les suppositoires (en cas de lavement baryté, un délai d'au moins 10 jours est nécessaire avant d'effectuer le recueil des selles).
- En cas de dosage des lipides (stéatorrhée des 24 heures) :
  - Pratiquer une surcharge alimentaire en beurre cru (50 gr par jour en plus du régime habituel chez l'adulte ou l'enfant de plus de 7 ans, 25 gr par jour en plus du régime habituel chez l'enfant entre 2 et 7 ans)



## **CLAIRANCE DE L'ALPHA-1-ANTITRYPSINE**

### **INTERET**

Cette analyse a pour but d'objectiver une exsudation protéique due à des lésions organiques de la paroi intestinale.

### **PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT**

- Recueillir la TOTALITE des selles pendant 3 jours consécutifs
- Utiliser chaque jour un nouveau récipient (fourni par le laboratoire)
- Stocker les récipients hermétiquement fermés dans le bas du réfrigérateur et apporter les 3 récipients au laboratoire à la fin du recueil.
- Un prélèvement sanguin est à effectuer à jeun (tube sec)